

Nazwa scenariusza	TCHÓRZLIWY STEFAN
Cele	<p>Cel główny:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Edukacja pacjenta na temat przygotowania pacjenta do zabiegu, przebiegu zabiegu operacyjnego i postępowania pooperacyjnego. <p>Cele szczegółowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zebranie wywiadu dot. obaw pacjenta do wyrażenie zgody na operację laparoskopowego usunięcia woreczka żółciowego.
Opis scenariusza	55-letni mężczyzna znajduje się na oddziale chirurgii ogólnej. Pacjent z rozpoznaną kamicą pęcherzyka żółciowego trafił na oddział z powodu kolki żółciowej. Jest to jego piąty pobyt na oddziale z powodu silnych bóli towarzyszących kolce. Pomimo zaleceń lekarzy, pacjent nie chce wyrazić zgody na zabieg. Przyczyną braku zgody jest jego brak wiedzy na temat konsekwencji choroby, a także wiele obaw dotyczących samego zabiegu i znieczulenia.
Informacje dla uczestników	55-letni mężczyzna znajduje się na oddziale chirurgii ogólnej. Pacjent z rozpoznaną kamicą pęcherzyka żółciowego trafił na oddział z powodu kolki żółciowej. Jest to jego kolejny pobyt na oddziale z powodu silnych bóli towarzyszących kolce. Pomimo zaleceń lekarzy, pacjent nie chce wyrazić zgody na zabieg.
Parametry wstępne	<p>Pacjent przytomny Drogi oddechowe drożne</p> <p>27 oddechów/min; niemierny głęboki, przyspieszony; SpO2 – 97% Temp. 36,8°C Poziom glikemii: 80mg% (na czczo)</p> <p>HR: 80/min RR: 138/87</p>
Wywiad medyczny	55-letni mężczyzna przyjęty z kamicą pęcherzyka żółciowego, przy przyjęciu bóle w nadbrzuszu, promieniujące do prawego barku i okolicy międzyłopatkowej. Hospitalizowany po raz piąty, cztery poprzednie hospitalizacje były spowodowane również ostrym bólem towarzyszącym kolce żółciowej. W przeszłości pacjent nie chorował. W wieku 15 lat usunięcie wyrostka robaczkowego. Ból wystąpił nagle po zjedzeniu śniadania, dzień wcześniej był na imprezie rodzinnej na której nie zważał na zalecaną mu dietę

Przebieg scenariusza	<p>Zakończenie pozytywne:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ocena stanu pacjenta — prawidłowo przeprowadzony wywiad z pacjentem na temat występujących obaw dotyczących zabiegu operacyjnego — wywiad nt. przyczyn niewyrażenia zgody na zabieg operacyjny — wywiad nt. wiedzy pacjenta na temat przygotowania, zabiegu operacyjnego oraz postępowania pooperacyjnego — zapewnienie pacjenta o włożeniu wszelkich starań by wszystkie procedury zostały zachowane — wyjaśnienie pacjentowi jak wyglądają przygotowania, zabieg i postępowanie pooperacyjne — wyjaśnienie pacjentowi różnicy między tradycyjną techniką usunięcia woreczka żółciowego a metodą laparoskopową — wyjaśnienie pacjentowi możliwych konsekwencji choroby — pacjent zostaje wyedukowany, jego obawy maleją — pacjent wyraża zgodę na zabieg operacyjny <p>Zakończenie negatywne</p> <ul style="list-style-type: none"> — Brak oceny stanu pacjenta — Brak wywiadu z pacjentem na temat występujących obaw dotyczących zabiegu operacyjnego — Brak wywiadu nt. przyczyn niewyrażenia zgody na zabieg operacyjny — Brak edukacji pacjenta na temat przygotowania do zabiegu, na temat samego zabiegu operacyjnego oraz postępowania pooperacyjnego — niezapewnienie pacjenta o włożeniu wszelkich starań by wszystkie procedury zostały zachowane — niewyjaśnienie pacjentowi różnicy między tradycyjną techniką usunięcia woreczka żółciowego a metodą laparoskopową — pacjent nie wyraża zgody na zabieg operacyjny
Koła ratunkowe	Do sali wchodzi żona pacjenta, która zadaje pytania dotyczące przygotowania, zabiegu operacyjnego oraz postępowania pooperacyjnego, a także różnicy pomiędzy zabiegiem laparoskopowym a tradycyjnym.
Kwestie do omówienia	<ul style="list-style-type: none"> — Komunikacja z pacjentem i jego rodziną — Sposoby komunikacji z pacjentem — Co było najtrudniejsze? — Czynniki wpływające na decyzję pacjenta